



Una mañana de agosto por la ribera de la Dehesa Boyal,
en la zona del Charco Alonso.



Buitrón - *Cisticola jundicis*

Es un minúsculo pajarillo, gracioso, vivo e inquieto, de apagados tonos, único representante europeo de su género, típicamente tropical.

El sol va remontando y el calor incita a las pequeñas aves a buscar la frescura del agua para calmar la sed.





Alcaudón Real – *Lanius meridionalis*

De pico grueso y ganchudo, cazan desde un posadero
insectos y pequeños vertebrados.



A small, dark-colored bird is perched on a thin, dark branch. The bird is facing left, with its head slightly turned. The background is a clear, bright blue sky. Some other branches with small, reddish-brown leaves are visible in the upper part of the frame.

En El Alosno lo conocemos como *Picapuerco real*.
Caza también pequeños pájaros que empala en los espinos de
un guadapero para poderlos desgarrar con su pico.



Perdiz Roja – *Alectoris rufa*.

Ave muy representativa de nuestra zona, codiciada por los aficionados a la caza y motivo de grandes letras de fandangos.



Abejaruco Común – *Merops apiaster*

Mirlo Común – *Turdus merula*.

La hembra del mirlo común es **marrón**, mientras el macho es negro, las hembras necesitan pasar desapercibidas ya que a ellas les tocará la labor de incubar y custodiar el nido.



Rabúo o Rabilargo – *Cyanopica cyanus*.

Córvido de pequeño tamaño (70 gr.) y de silueta muy parecida a la de la Urraca, con alas y cola de color celeste, cabeza con capirote negro.



La dieta del rabilargo es básicamente insectívora, siendo más frugívora en otoño e invierno y más específicamente insectívora en primavera y verano.



Es presa frecuente de múltiples depredadores, tanto aéreos como terrestres.



Son monógamos, manteniéndose las parejas incluso durante varios años consecutivos. Las puestas comienzan a finales de marzo o principios de abril. Pone 6-7 huevos en nidos abiertos)



Zampullín común o somorgujo pequeño - Tachybaptus ruficollis

Se zambulle continuamente y permanece bajo el agua por períodos que no suelen superar los 15-20 segundos.

Su hábitat típico durante la primavera y parte del verano lo constituyen lagunas con vegetación acuática, charcas y remansos.

Los zampullines comunes se alimentan, sobre todo, de insectos acuáticos, pequeños peces y moluscos.



A small brown bird, identified as a Common Noddy (Alcedo atthis), is perched on a thin, reddish-brown branch. The bird has a dark head and back with a lighter, reddish-brown belly. It is surrounded by a dense thicket of green leaves and branches, with sunlight filtering through the foliage.

Martín pescador común - Alcedo atthis

Es como una flecha azul turquesa que surge y desaparece en un recodo del río.



Con un poco de paciencia, podrá vérselo sumergirse vigorosamente bajo el agua, con el pico apuntando a algún pececillo; luego vuelve rápidamente a su posadero.



Trabajo realizado con una cámara Canon EOS 500D
Objetivo Canon Zoom 75-300 mm.
Filtro polarizador



En El Alosno el 06-08-2012
A. Blanco